

Förlossningsbristningar och upplevd vårdkvalité hos svenska kvinnor

**Noomi Grönberg T11 student läkarprogrammet
Umeå**

Huvudhandledare: Mojgan Pakbaz
Handledare: Maria Lindqvist, Margareta Nilsson och Per Liv

GynOp



UMEÅ UNIVERSITY

Syftet med vår studie

- Frågeställningar:
- 1. Är kvinnor med allvarligare grad av bristning (3+4) mer missnöjda med vården jämfört med kvinnor som fått en 2a gradens bristning?
- 2. Är kvinnor som rapporterat en komplikation mer missnöjda med vården jämfört med kvinnor som rapporterat att de inte utvecklat en komplikation efter sin bristning?


Bakgrund

- 1. Det är många kvinnor som får bristningar, både nationellt och internationellt
 - Detta leder till stor påverkan fysiskt och psykiskt
- 2. Idag finns enbart ett fåtal kvalitativa studier om hur patienten uppfattar obstetrisk vård
- Vidare kvantitativa studier behövs fokus på kvalitet ur patientens perspektiv

Metod och upplägg

- Retrospektiv studie
- Data från bristningsregistret
 - Bristningsregistret skickar frågeformulär till drabbade kvinnor efter förlossningen
- → Vi har valt ut 2 frågeformulär som skickas till patienten efter 8 veckor
- Analysmetod - Logistisk regression

Bristningsregistrets frågeformulär




Utvalda KUPP frågor

- 4 frågor med fokus på patientinformation och 4 frågor med fokus på bemötande


	Instämmer helt	Instämmer till stor del	Instämmer delvis	Instämmer inte alls	Ej aktuellt
1. Jag fick bra information om hur operationen skulle gå till	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. Jag fick bra information om resultatet av operationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. Jag fick bra information om hur jag skulle sköta mig efter hemkomsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. Jag fick tillräcklig information om hur jag kunde få kurator-/psykologkontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. Läkarna bemötte mig med respekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. Läkarna visade engagemang; "brydde sig om mig"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. All annan vårdpersonal bemötte mig med respekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1. All annan vårdpersonal visade engagemang; "brydde sig om mig"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Vilka inkluderades?

- Bristning av andra, tredje och fjärde graden
- Augusti 2015 – Februari 2019
- Svarat på 8-veckors formuläret på webben. Specifikt svarat på frågan om de utvecklade en komplikation
- Sedan gått vidare och svarat på frågorna "Kvalité Ur Patientens Perspektiv" (KUPP)
- **Totalt 4299 kvinnor i studien**



Resultat - fördelning



Resultat - Frågeställning 1

- **→ Kvinnor med förlossningsbristning grad 3 och 4 är mer missnöjda i jämförelse med kvinnor med bristning av 2a graden**
 - OR 1.26 – 2.31 högre odds att en kvinna med bristning av 3e och 4e graden är missnöjd
- En fråga skiljde sig från mängden:
 - KUPP fråga; I received good information how to adjust to daily activities after returning home, gav OR < 1 (0.79)
 - 21 % lägre odds att en kvinna med bristning av 3e och 4e graden är missnöjd, i jämförelse med kvinnor som fått en 2a gradens bristning. Dvs mer troligt att kvinnor med bristning av 2a graden är missnöjda.

QPP - QUESTION	ODDS RATIO	CI	P-VALUE
QPP 1 - I received good information how the operation would be performed Perineal tear degree ≥ 3	2.31	2.00 – 2.66	< 0.001
QPP 2 - I received good information about the operation outcome Perineal tear degree ≥ 3	1.26	1.09 – 1.45	0.002
QPP 3 - I received good information how to adjust to daily activities after returning home Perineal tear degree ≥ 3	0.79	0.68 – 0.91	0.001
QPP 4 - I got enough information about how I could get counsellor / psychologist contact Perineal tear degree ≥ 3	1.27	1.11 – 1.46	0.001
QPP 5 - The doctors treated me with respect Perineal tear degree ≥ 3	1.36	1.01 – 1.81	0.041
QPP 6 - Doctors showed commitment; "Cared about me" Perineal tear degree ≥ 3	1.34	1.09 – 1.65	0.006
QPP 7 - All other healthcare-personnel treated me with respect Perineal tear degree ≥ 3	1.43	1.12 – 1.82	0.004
QPP 8 - All other healthcare-personnel showed commitment; "Cared about me" Perineal tear degree ≥ 3	1.39	1.13 – 1.72	0.002

Resultat – frågeställning 2

- → **Kvinnor som rapporterar komplikation är mer missnöjda i jämförelse med dem som rapporterat ingen komplikation.**
 - OR i samtliga analyser 1.49 – 2.24 (CI 1.59-2.50)

QPP - QUESTION	OR	CI	P-VALUE
QPP 1 - I received good information how the operation would be performed Complication	2.15	1.87 – 2.46	< 0.001
QPP 2 - I received good information about the operation outcome Complication	2.12	1.84 – 2.44	< 0.001
QPP 3 - I received good information how to adjust to daily activities after returning home Complication	2.03	1.76 – 2.34	< 0.001
QPP 4 - I got enough information about how I could get counsellor / psychologist contact Complication	1.43	1.24 – 1.65	< 0.001
QPP 5 - The doctors treated me with respect Complication	2.24	1.71 – 2.92	< 0.001
QPP 6 - Doctors showed commitment; "Cared about me" Complication	2.20	1.81 – 2.67	< 0.001
QPP 7 - All other healthcare-personnel treated me with respect Complication	2.00	1.59 – 2.50	< 0.001
QPP 8 - All other healthcare-personnel showed commitment; "Cared about me" Complication	1.91	1.56 – 2.33	< 0.001

Diskussion

Varför är de med allvarligare grad av bristning och rapporterad komplikation mer missnöjda?

- Patienter som påverkas kroppsligt i större utsträckning och sjukare patienter tenderar att vara mer missnöjda
- En viktig faktor för patientnöjdhet är fysisk komfort

Mål för bättre vård

- Det krävs mer grundlig genomgång och information genom hela vårdförloppet om förlossningsskadan, speciellt viktigt för de som drabbas av en allvarligare bristningskada
- Dock viktigt att inte försumma de med 2a gradens bristning, speciellt i avseendet ”information hur de ska anpassa sig till dagliga aktiviteter då de kommer hem”
- Viktigt med rutinmässiga uppföljningar för alla bristningsgrader för att fånga upp kvinnor som utvecklar komplikationer och kräver vägledning i senare skede

Slutsatser

- Den största utmaningen är att uppfylla behoven hos dem med
bristning av tredje eller fjärde graden samt de som rapporterat
komplikationer

Hälsa – WHO's definition

- “A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”
- För att kunna uppnå god hälsa bland kvinnor med bröstningar ska vi inte enbart behandla det fysiska besvären utan även värna om god mental hälsa och socialt välbefinnande. Vi anser därav att det är viktigt med adekvat och lättillgänglig information, vägledning och bemöta patienterna med respekt och engagemang.

TACK!

Frågor?

GynOp



UMEÅ UNIVERSITY